






СХЕМА за опазване на Костилкови овощни от болести

Предлаганата схема е информативна. В нея са включени разрешени продукти в опаковки до 1 кг, от офертата на „Агропал“ ООД. За всяка болест/неприятел се прилага един от предложените в схемата продукти. При необходимост продукт, предназначен за борба с една болест/неприятел, може да се прилага в резервоарна смес с друг продукт, срещу друга болест/неприятел. Консултирайте се с вашия търговец. Преди употреба на продукт за растителна защита прочетете внимателно етикета и листовката и спазвайте указанията на производителя!

Праскови и Кайсии (предлаганата схема е информативна и включва разрешени продукти, които се предлагат от „Агропал“ ООД)

ФАЗА	БОЛЕСТ/ФУНГИЦИД
 Есен при опадали листа ВВСН 95-97  Набъбване на пъпките ВВСН 01-09	БАКТЕРИОЗА: Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (40-50г/10л вода); САЧМЯНКА: Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (40-50г/10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 150-250г/дка (15-25г/10л вода) – кайсии; Шампион 50ВП 300г/дка (30г/10л вода) – кайсии СТРУПЯСВАНЕ: Фунгуран ОН 50ВП 150-250г/дка (15-25г/10л вода) – праскови и нектарини РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (40-50г/10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 150-250г/дка (15-25г/10л вода) – кайсии; Шампион 50ВП 300г/дка (30г/10л вода) – кайсии КЪДРАВЕСТ (праскови): Каптан 80ВГ 250г/дка (25г/10л вода); Скор 250ЕК 0,02% (2мл/10л вода); Тирам 80ВГ 0,3% (30г/10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 0,15% (15г/10л вода); Шавит Ф 72ВДГ 0,2% (20г/10л вода); Шампион 50ВП 0,3% (30г/10л вода) <i>При зимните пръскания (есен при опадали листа и пролет при набъбване на пъпките) за едно дръвче с корона около 3 м необходимият работен разтвор е приблизително 6-9л.</i>
 Начало на цъфтеж ВВСН 51-59  Цъфтеж ВВСН 60-69	САЧМЯНКА: Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (40-50г/10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 150-250г/дка (15-25г/10л вода) РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Каптан 80ВГ 150-180г/дка (15-18г/10л вода); Делан 700ВДГ 50г/дка (5г/10л вода); Топсин М 70ВДГ 0,12% (12г/10л вода); Хорус 50ВГ 0,045% (4,5г/10л вода)
 Развитие на листата ВВСН 10-19	БАКТЕРИОЗА, САЧМЯНКА, СТРУПЯСВАНЕ: Продуктите срещу бактериоза, сачмянка и струпясване, описани при есенното третиране и при набъбване на пъпките БРАШНЕСТА МАНА: Сяра ВГ 600г/дка (60г/10л вода); Скор 250ЕК 0,02% (2мл/10л вода); Топаз 100ЕК 0,015% (1,5мл/10л вода) ГНОМОНИЯ (кайсии): Делан 700ВДГ 50г/дка (5г/10л вода)
 Развитие на леторастите ВВСН 31-39	КЪДРАВЕСТ (при поява): Скор 250ЕК 0,02% (2мл/10л вода) РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Делан 700ВДГ 50г/дка (5г/10л вода); Топсин М 70ВДГ 0,12% (12г/10л вода); Хорус 50ВГ 0,045% (4,5г/10л вода)
 Развитие, нарастване и узряване на плодовете ВВСН 71-99	БРАШНЕСТА МАНА: Скор 250ЕК 0,02% (2мл/10л вода); Сяра ВГ 600г/дка (60г/10л вода); Топаз 100ЕК 0,015% (1,5мл/10л вода) РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Делан 700ВДГ 50г/дка (5г/10л вода); Хорус 50ВГ 0,045% (4,5г/10л вода) КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Каптан 80ВГ 150-180г/дка (15-18г/10л вода); Хорус 50ВГ 0,045% (4,5г/10л вода)

Череш и Сливи (предлаганата схема е информативна и включва разрешени продукти, които се предлагат от „Агропал“ ООД)




 Есен при опадали листа  Пролет при набъбване на пъпките	БАКТЕРИОЗА, МЕХУРКИ (по сливи): Бордо микс 20ВП 375-500г/дка (40-50г/10л вода) КЪДРАВЕСТ (по череш и сливи): Каптан 80ВГ 250г/дка (25г/10л вода) РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Тирам 80ВГ 0,3% (30г/10л вода); Шампион 50ВП 300г/дка (30г/10л вода) САЧМЯНКА: Тирам 80ВГ 0,3% (30г/10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 130-200г/дка (13-20г/10л вода); Шампион 50ВП 300г/дка (30г/10л вода)
 Начало на цъфтеж (бял бутон)  Развитие на листата и леторастите	РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Тирам 80ВГ 0,3% (30г/10л вода); Хорус 50ВГ 0,045% (4,5г/10л вода) РАННО И КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Каптан 80ВГ 150-180г/дка (15-18г/10л вода) САЧМЯНКА: Каптан 80ВГ 150-180г/дка (15-18г/10л вода); Тирам 80ВГ 0,3% (30г/10л вода); Фунгуран ОН 50ВП 130-200г/дка (13-20г/10л вода)
 Формиране на плода	БЯЛА РЪЖДА (по череш и вишни): Делан 700ВДГ 50г/дка (5г/10л вода); Силит 40СК 150мл/дка (15мл/10л вода); Скор 250ЕК 0,03% (3мл/10л вода); Флинт макс 75ВГ 30г/дка (3г/10л вода) РАННО И КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Каптан 80ВГ 150-180г/дка (15-18г/10л вода)
 Нарастване и узряване на плодовете	РАННО И КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Каптан 80ВГ 150-180г/дка (15-18г/10л вода) КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ: Хорус 50ВГ 0,045% (4,5г/10л вода) БЯЛА РЪЖДА (по череш и вишни) – след беритба: Делан 700ВДГ 50г/дка (5г/10л вода); Силит 40СК 150мл/дка (15мл/10л вода)

♣ Количеството на работния разтвор за едно развито дръвче е около 1,2-1,5л

СХЕМА за опазване на Костилкови овощни от неприятели





издание на 

Праскови и Кайсии (предлаганата схема е информативна и включва разрешени продукти, които се предлагат от „Агропал“ ООД)

ФАЗА	НЕПРИЯТЕЛ/ИНСЕКТИЦИД
 Есен при опадали листа ВВСН 95-97	ЗИМУВАЩИ ФОРМИ (яйца, ларви, нимфи, какавиди възрастни): Минерални и парафинови масла При зимните пръскания (есен при опадали листа и пролет при набъбване на пъпките) за едно дръвче с корона около 3 м необходимият работен разтвор е приблизително 6-9л.
 Набъбване на пъпките ВВСН 01-09	АНАРЗИЯ: Вазтак нов 100ЕК 0,015% (1,5мл/10л вода); Дека ЕК 50-70мл/дка (5-7мл/10л вода); Метеор 90мл/100л вода (9мл/10л вода) МНОГОЯДНИ НЕПРИЯТЕЛИ: Вазтак нов 100ЕК 0,015% (1,5мл/10л вода); Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,03% (3мл/10л вода); Калипсо 480СК 15мл/100л вода (1,5мл/10л вода) ХОБОТНИЦИ: Метеор 60-90мл/100 вода (6-9мл/10л вода) ЩИТОНОСНИ ВЪШКИ: Би-58 нов 0,1% (10мл/10л вода); Вазтак нов 100ЕК 0,02% (2мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,04% (4мл/10л вода) АКАРИ: Санмайт 20 ВП 0,05% (5г/10л вода); Данитрон 5СК 0,05% (5мл/10л вода); Нисоран 5ЕК 0,05% (5мл/10л вода)
 Цъфтеж ВВСН 60-69	ПЕТНИСТОКРИЛА ДРОЗОФИЛА: Продуктите срещу дрозифилата, описани при „развитие на листата“ ПЛОДОВИ ОСИ: Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,05% (5мл/10л вода) АНАРЗИЯ: Продуктите срещу анарзия, описани при „набъбване на пъпките“ ТРИПСИ: Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Метеор 70-90мл/100л вода (7-9мл/10л вода)
 Развитие на листата ВВСН 10-19	ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ: Дека ЕК 50-70мл/дка (5-7мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,04% (4мл/10л вода); Димилин 25ВП 0,04% (4г/10л вода); Ефория 0453К 150мл/дка (15мл/10л вода); Кораген 20СК 16-20мл/100л вода (1,6-2мл/10л вода); Метеор 90мл/100л вода (9мл/10л вода) МНОГОЯДНИ НЕПРИЯТЕЛИ: Продуктите срещу многоядни неприятели, описани при „набъбване на пъпките“ ЛИСТНИ ВЪШКИ: Би-58 нов 0,05-0,07% (5-7мл/10л вода); Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Ефория 0453К 150мл/дка (15мл/10л вода); Калипсо 480СК 20мл/100л вода (2мл/10л вода); Метеор 70-90мл/100л вода (7-9мл/10л вода) ПЕТНИСТОКРИЛА ДРОЗОФИЛА: Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Калипсо 480СК 15мл/100л вода (1,5мл/10л вода); Кораген 20СК 16-20мл/100л вода (1,6-2мл/10л вода) АКАРИ: Продуктите срещу акари, описани при поява на „набъбване на пъпките“
 Развитие на леторастите ВВСН 31-39	ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ: Продуктите срещу източен плодов червей, описани при „развитие на листата“ АНАРЗИЯ: Кораген 20СК 16-20мл/100л вода (1,6-2мл/10л вода) или някой от продуктите срещу анарзия, описани при „набъбване на пъпките“ ЛИСТНИ ВЪШКИ: Продуктите срещу листни въшки, описани при „развитие на листата“ ХОБОТНИЦИ: Метеор 60-90мл/100л вода (6-9мл/10л вода)
 Развитие, нарастване и узряване на плодвете ВВСН 71-99	ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ: Авант 150ЕК 0,033% (4мл/10л вода); Дека ЕК 50-70мл/дка (5-7мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,04% (4мл/10л вода); Ефория 0453К 150мл/дка (15мл/10л вода); Метеор 90мл/100л вода (9мл/10л вода) ПЛОДОВИ ОСИ: Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,05% (5мл/10л вода) ЛИСТНИ ВЪШКИ: Дантоп 50ВГ 0,008-0,012% (1г/10л вода) или някой от продуктите описани при развитие на листата

Череша и Сливи

(предлаганата схема е информативна и включва разрешени продукти, които се предлагат от „Агропал“ ООД)

 Есен при опадали листа Пролет при набъбване на пъпките	ЗИМУВАЩИ ФОРМИ (яйца, ларви, нимфи, какавиди възрастни): Минерални и парафинови масла МНОГОЯДНИ НЕПРИЯТЕЛИ: Вазтак нов 100ЕК 0,015% (1,5мл/10л вода); Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,03% (3мл/10л вода); Калипсо 480СК 20мл/100л вода (2мл/10л вода) ЩИТОНОСНИ ВЪШКИ: Би-58 нов 0,1% (10мл/10л вода); Вазтак нов 100ЕК 0,02% (2мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,04% (4мл/10л вода)
 Начало на цъфтеж (бял бутон) Развитие на листата и леторастите	СЛИВОВА ПЛОДОВА ОСА: Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,05% (5мл/10л вода) при бял бутон МНОГОЯДНИ НЕПРИЯТЕЛИ: Продуктите срещу многоядни неприятели, описани при „набъбване на пъпките“ ЛИСТНИ ВЪШКИ: Би-58 нов 0,05-0,07% (5-7мл/10л вода); Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Ефория 0453К 150мл/дка (15мл/10л вода); Калипсо 480СК 20мл/100л вода (2мл/10л вода); Метеор 70-90мл/100л вода (7-9мл/10л вода)
 Формиране на плода	ЛИСТНИ ВЪШКИ: Дантоп 50ВГ 0,008-0,012% (1г/10л вода) или някой от продуктите описани при „развитие на листата“ ВИШНЕВ ХОБОТНИК: Метеор 60-90мл/100л вода (6-9мл/10л вода) СЛИВОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ: Вазтак нов 100ЕК 0,0125% (1,3мл/10л вода); Дека ЕК 50-70мл/дка (5-7мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,05% (5мл/10л вода); Димилин 25ВП 0,05% (5г/10л вода); Ефория 0453К 150мл/дка (15мл/10л вода); Кораген 20СК 16-20мл/100л вода (1,6-2мл/10л вода) СЛИВОВА ПЛОДОВА ОСА: Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,05% (5мл/10л вода) ЧЕРЕШОВА МУХА: Вазтак нов 100ЕК 0,015% (1,5мл/10л вода); Децис 2,5ЕК 0,03% (3мл/10л вода); Ефория 0453К 150мл/дка (15мл/10л вода); Калипсо 480СК 20мл/100л вода (2мл/10л вода); Карате зеон 15мл/дка (1,5мл/10л вода); Фюри 10ЕК 0,0125% (1,25мл/10л вода) при зажълтяване на плодвете и 10-12 дни по-късно
 Нарастване и узряване на плодвете	СЛИВОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ: Продуктите срещу сливов плодов червей, описани при „формиране на плода“ ПЕТНИСТОКРИЛА ДРОЗОФИЛА: Дека ЕК 30-50мл/дка (3-5мл/10л вода); Карате зеон 15мл/дка (1,5мл/10л вода); Калипсо 480СК 15мл/100л вода (1,5мл/10л вода); Кораген 20СК 16-20мл/100л вода (1,6-2мл/10л вода) МНОГОЯДНИ НЕПРИЯТЕЛИ: Карате зеон 5КС 15мл/дка (1,5мл/10л вода) или някой от продуктите описани при „набъбване на пъпките“

♣ Количеството на работния разтвор за едно развито дръвче е около 1,2-1,5л

ФУНГИЦИДИ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
Бордо микс 20ВП	4
Делан 700ВГ	няма данни
Каптан 80ВГ	5
Силит 40СК	2
Скор 250ЕК	3
Сяра ВГ	8
Тирам 80ВГ	няма данни
Топаз 100ЕК	няма данни
Топсин М 70ВДГ	1
Флинт макс 75ВГ	2
Фунгуран ОН 50ВП	3
Хорус 50ВГ	няма данни
Шавит Ф 72ВДГ	няма данни
Шампион 50ВП	3

ИНСЕКТИЦИДИ И АКАРИЦИДИ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
Авант 150ЕК	3
Би-58 нов	няма данни
Вазтак нов 100ЕК	няма данни
Данитрон 5СК	няма данни
Дантоп 50ВГ	2
Дека ЕК	2
Децис 2,5ЕК	3
Димилин 25ВП	няма данни
Ефория 0453К	2
Карате зеон 5КС	1
Калипсо 480СК	2
Кораген 20СК	2
Метеор	3
Санмайт 20ВП	1
Нисоран 5ЕК	1
Фюри 10ЕК	няма данни




Ефория®

045 3К

В малки опаковки от 250ml и 50ml ще намерите само в



15г/кг ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН и 30г/кг ТИАМЕТОКСАМ Syngenta®



София тел. 02/994 62 50, 0885 733 025; Хасково тел. 0884 604 454; Кюстендил тел. 0885 161126; Търговище тел. 0885 839285
www.agropal-bg.com

Уважаеми клиенти,

С тази листовка бихме искали да ви осигурим информация за времето, начина и дозите на приложение на препаратите за растителна защита (ПРЗ), които ползвате в двора или градината. Тя е предназначена за хора, които нямат професионална квалификация, но имат желанието да се занимават със земеделие и нуждата да опазят културите, които отглеждат.

Продуктите за растителна защита носят полза, но с тях трябва да се работи стриктно и внимателно. Затова върху етикета на всяка опаковка има написана фразата „Преди употреба внимателно прочетете етикета и спазвайте инструкциите за употреба“. Това ще ви гарантира ефикасност на ПРЗ, както и вашата безопасност при работа и при консумация на третираната продукция.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА С ПРЗ (препоръките за работа с всеки продукт са отразени на неговия етикет)

Безопасна работа. При приготвяне на разтвора и при самото третиране трябва да се носи предпазно работно облекло, високи обувки, маска, очила и ръкавици. По никакъв начин не работете с ПРЗ преди да сте си сложили латексови или гумени ръкавици и очила.

Интервали на третиране. По принцип **фунгицидните пръскания** се извършват през 5 до 14 дни, в зависимост от това, какъв е продуктът – контактен, локално системен или системен. При сухо време се третира през 7-10 дни, ако препаратът е контактен, и през 12-14 дни, ако ползвате системни и комбинирани препарати. Интервалите на третиране са описани в етикетите на продуктите и трябва стриктно да се спазват, за да получите очаквания резултат.

Третиранията **срещу неприятели** се правят само след появата им, освен продуктите, които се прилагат в почвата.

От съществена важност за постигане на оптимален ефект от прилагането на ПРЗ е техниката, с която третирате. Не можете да очаквате добри резултати ако не знаете какви площи можете да изпръскате с една пръскачка „или колко площ ще изпръскате с определено количество вода „разтвор“. Затова е необходимо да направите

КАЛИБРИРАНЕ НА ПРЪСКАЧКАТА

Калибрирайте пръскачката си, за да знаете с какво количество вода (работен разтвор) изпръскате определена площ. Само така ще можете да определите количеството препарат, което трябва да се сложи в една пръскачка или в определено количество вода. Трябва да имате представа с какво количество вода ще изпръскате определена площ с вашата пръскачка. Калибрирането на пръскачката се прави само с вода, а не с работен разтвор. Разходът на работния разтвор ще зависи от площта, която ще третирате, от вашия маниер на пръскане и от това, дали третирате почва, посев или трайни насаждения. По принцип трябва да знаете с какво количество вода ще изпръскате определена площ (почва, посев или трайно насаждение).

Но за да опростим нещата ще ги сведем до няколко случая:

1. Колко вода ще ви трябва, за да изпръскате определена площ с почвен хербицид. За тази цел отмерете, макар и приблизително, една площ (ще я наречем „опитна“) от 100м² (колкото по-голяма е опитната площ, толкова по-точен резултат ще имате). Напълнете пръскачката и изпръскайте отмерената площ. Измерете колко вода сте изразходвали за третирането на опитната площ. Така ще можете да изчислите колко вода ще ви трябва, за да изпръскате реалната площ за третиране на полето (двора, градината).

Пример: измерили сте **опитна площ за калибрирането** от 100м². След изпръскването ѝ сте установили, че сте изразходвали 2 л вода. Искате да изпръскате **реална площ** от 350м². Необходимото количество за тази площ ще намерите като използвате следната проста формулка

$$\text{Нужното количество вода за } 350\text{м}^2 = \frac{\text{Площта за третиране (350м}^2\text{)} \times \text{Количеството вода, изпръскано на опитната площ (2л)}}{\text{Опитната площ на която сте калибрирали пръскачката (100м}^2\text{)}}$$

или изчислено от

$$\text{Нужното количество вода за } 350\text{м}^2 = \frac{350 \times 2}{100} = 7 \text{ л вода}$$

* Стойностите в дадения пример трябва да замените с реалните стойности на опитната площ, която вие сте си избрали, както и реално изразходваната вода, с която сте я напъскали.

Така вие вече можете да си изчислите за всяка конкретна площ, която искате да изпръскате, колко вода ще ви е необходима.

2. Колко вода ще ви трябва, за да изпръскате определен посев с ПРЗ. В този случай нещата са малко по-сложни, защото в различните периоди, в които е необходимо да се пръска, големината на растенията е различна и, съответно, различно ще е и необходимото количество вода. Идеалният вариант е да правите калибриране на пръскачката преди всяко пръскане, за да е съобразено пръскането с размера на растенията в конкретния момент. Когато вече имате опит ще имате представа при различните моменти на пръскане какво количество вода ви трябва и няма да е необходимо да повтаряте калибрирането всеки сезон. Но ако това не ви се прави преди всяко пръскане направете го поне веднъж преди първото третиране. При следващите третиранения увеличете количеството на разтвора, с който ще пръскате, приблизително с процента на израстване на посева. Ако посевът е пораснал два пъти от едното до другото третиране, увеличете количеството на водата приблизително толкова.

3. Колко вода ще ви трябва, за да изпръскате лозя или овощни дръвчета с ПРЗ. И в този случай трябва като правило да се подходи по сходен с горния начин. Направете калибриране на пръскачката като опръскайте едно дръвче или лозяница. В началните периоди от развитието на трайните насаждения количеството на работния разтвор е значително по-малко, отколкото при пълното им развитие. Затова докато придобиете опит за нужното количество вода за изпръскването на трайните е препоръчително калибрирането да се извършва преди всяко пръскане. На следващата година вече ще имате опит и няма да бъде нужно отново да калибрирате. Но няма да е лошо да си запишете в една тетрадка с колко вода сте направили първото пръскане, с колко второто и т.н. за всички пръскания през сезона. И понеже става въпрос за трайни насаждения, пръсканията ви ще бъдат сходни всяка година.

След калибриране на пръскачката много по-лесно ще определяте и количество ПРЗ за всяко пръскане. За ваше улеснение можете да ползвате следната таблица:

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТ ЗА РАЗЛИЧНА ПЛОЩ

РАЗРЕШЕНА ДОЗА в мл/г на дка	10	15	20	25	50	75	100	150	200	250
ПЛОЩ ЗА ТРЕТИРАНЕ в м ²										
50	0.50	0.75	1.00	1.25	2.50	3.75	5.00	7.50	10.00	12.50
100	1.00	1.50	2.00	2.50	5.00	7.50	10.00	15.00	20.00	25.00
150	0.15	2.25	3.00	3.75	7.50	11.25	15.00	22.50	30.00	37.50
200	0.03	3.00	4.00	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00
250	2.50	3.75	5.00	6.25	12.50	25.00	37.50	50.00	62.50	

В зеления сектор са нанесени различни възможни дози на употреба, а в синия – площта, която ще третирате. В белия сектор се намират клетките с количествата ПРЗ необходими при дадена доза за определена площ. Примерно, ако ще пръскате 150м² с ПРЗ, чиято доза е 25мл/дка засичате реда, на който е площта от 150м² с колоната за доза 25мл/дка и виждате, че за тази площ са ви необходими 3,75мл продукт.

Използвайте продуктите, съгласно разрешения максимален брой третиранения през годината, който е даден в етикета на всеки ПРЗ. Превияшаване на този максимално допустим брой приложения за един вегетационен сезон може бързо да доведе до придобиване на устойчивост на вредителите и намаляване на ефекта от приложението на продукта.